

## Uyuz hastalığı (Scabies)



TÜRKÇE  
TÜRKISCH

### Uyuz hastalığı (Scabies) nasıl anlaşılır?

Ciltte kırmızı lekeler oluşur ve kaşınır, ve el veya ayak parmaklarının arasında, koltuk altı veya genital bölge gibi sıcak deri kıvrımlarında kaşıntı olur. Geceleri sıcak yorganın altında ise kaşıntı daha da şiddetlenir.



Bu belirtiler görüldüğünde **doktora** başvurulmalıdır.



### Doktor size uyuz hastalığı teşhisi koyduğunda:

#### Yakınlarınız

Yakın fiziksel temasta bulunulan tüm kişiler bilgilendirilmelidir.



Bu kişilerin de doktora gitmesi gerekir.



**Tedavi için bkz. arka sayfa.**  
**Genel tedbirler için bkz. sayfa 2.**



## Uyuz hastalığı nasıl tedavi edilir?\*

Doktor size kullanmanız için bir krem yazar.



Duş almalı, tırnaklarınızı temizlemeli ve kısaltmalısınız.



Kremi kafanız dışında tüm vücuduna eşit miktarda sürün (4 yaşından büyük kişiler için).

Krem en az 8 saat etki etmelidir, ör. gece boyunca. Kremi, sabun ile yıkayın.

7 gün sonra tekrarlayın.

Temiz giysiler giyin.



Ivermectin (Scabioral®) ile alternatif tedavi: Vücut ağırlığına göre her bir kg için 200 mikrogram olacak şekilde, 1 x 1 ağız yoluyla. 7 gün sonra tekrarlayın.



Tedavinin başarılı olup olmadığı, doktor tarafından kontrol edilmelidir.



.....  
\* Bu bilgi, Permethrin (ör. Infectoscab®, Nix™, Dermal Cream™, Elimite™) ile yapılan tedaviye ilişkindir. Diğer maddeler (ör. Benzilbenzoat (Antiscabiosum®)) için tedavilerin tekrarlanması gerekebilir. Lütfen her halükarda doktorunuzun verdiği ve prospektüste bulunan talimatları dikkate alın.

## Genel hijyenik tedbirler

Cilde temas eden her şeyi en az 50°C'de yıkayın  
(nevresimler, giysiler, havlular)

veya

3 gün boyunca sıkıca kapatılmış bir plastik poşete  
koyup kullanmayın

veya

2 saat boyunca dondurun

ve

Döşemeli mobilyaları elektrikli süpürge ile süpürün.

Her gün çamaşır değiştirin.

.....  
Dieses Informationsblatt wurde gefördert vom Amt  
für Flüchtlingshilfe Esslingen.

© Bild und Sprache e.V.  
www.medi-bild.de  
info@medi-bild.de

